

胸外科护士对肿瘤患者护理认知现状的调查及对策分析

牟 岚, 金志惠

贵州医科大学附属医院 贵州贵阳

【摘要】目的 探讨胸外科护士对肿瘤患者护理认知现状的调查, 并根据调查结果提出相应的对策。**方法** 研究与 2021 年 7 月开展, 在此期间从本地区 3 家医院中选取胸外科护士 120 名进行相关分析, 同时每家医院各选取患者 30 名进行护理满意度评价, 2022 年 7 月完成研究。为了分析胸外科护士是否对肿瘤患者护理认知现状有所了解, 并总结相关对策, 研究期间制作关于胸外科肿瘤患者护理知识调查问卷。获取调查结果后了解护理人员的相关认知情况, 主要包括心理护理、疾病知识宣教、疼痛及治疗护理等方面, 依据调查情况, 提出如何提高护理整体水平的相关对策。**结果** 通过调查问卷分析得知, 本研究选取的三组护理人员, 无论是操作技能方面的得分, 还是认知态度得分相比, 均无较大的差异, 不具有统计学意义 ($P > 0.05$)。三组护理人员对于死亡教育的认知态度和操作技能评分与其他项目调查结果相比, 存在较大的差异, 具有统计学意义 ($P < 0.05$)。统计胸外科患者的护理满意度情况, 进行三组比较, 结果显示差异无统计学意义 ($P > 0.05$)。**结论** 在胸外科护理工作开展的过程中, 针对肿瘤患者护理期间, 护理人员对患者护理认知现状的调查具有重要意义。在实际调查中能够分析护理人员的状况, 同时总结工作中存在的问题, 从而对护理人员开展针对性的健康教育及培训, 进一步提高认知和操作技能水平, 这对护理人员服务意识及责任感的提高, 以及促进临床护理工作效率及护理质量方面有着重要作用。

【关键词】 胸外科护士; 在肿瘤患者; 护理认知现状; 对策

Investigation and countermeasure analysis on the status quo of nursing cognition of tumor patients by nurses in thoracic surgery

Lan Mou, Zhihui Jin

Affiliated Hospital of Guizhou Medical University Guiyang, Guizhou

【Abstract】 Objective To investigate the status quo of nursing cognition among thoracic surgery nurses on cancer patients, and to propose corresponding countermeasures according to the survey results. **Methods** The study was carried out in July 2021. During this period, 120 thoracic surgery nurses were selected from 3 hospitals in the region for correlation analysis, and 30 patients were selected from each hospital for nursing satisfaction evaluation. The study was completed in July 2022. . In order to analyze whether nurses in thoracic surgery have any understanding of the current situation of nursing cognition of tumor patients, and summarize relevant countermeasures, a questionnaire on nursing knowledge of thoracic surgery patients with tumor was made during the study. After obtaining the survey results, the relevant cognitive situation of nursing staff was understood, mainly including psychological nursing, disease knowledge education, pain and treatment nursing, etc. According to the survey results, relevant countermeasures on how to improve the overall level of nursing were put forward. **Results** The questionnaire analysis showed that the three groups of nursing staff selected in this study had no significant difference in terms of operational skills or cognitive attitude scores, and there was no statistical significance ($P > 0.05$). . Compared with the survey results of other items, the three groups of nursing staff's cognitive attitude and operational skills scores on death education were significantly different ($P < 0.05$). The nursing satisfaction of thoracic surgery patients was counted, and the three groups were compared, and the results

showed that there was no significant difference ($P>0.05$). **Conclusion** In the process of thoracic surgery nursing work, it is of great significance to investigate the status quo of nursing staff's nursing cognition during the nursing period of tumor patients. In the actual investigation, it is possible to analyze the status of the nursing staff, and at the same time summarize the problems existing in the work, so as to carry out targeted health education and training for the nursing staff, and further improve the level of cognition and operation skills. It plays an important role in improving and promoting clinical nursing work efficiency and nursing quality.

【 Keywords 】 thoracic surgery nurses; in cancer patients; current situation of nursing cognition; countermeasures

引言

当前, 社会经济正以迅猛发展的态势崛起, 其改变了人们的生活方式, 但各种因素的变化导致肿瘤患者的数量越来越多, 导致肿瘤发生的原因可能与患者的生活压力过大及环境恶化有关。目前, 针对肿瘤的治疗, 临床中常采用手术切除的方法, 然而手术对相关指证的要求较高, 同时治疗后患者的身体状态和心理状态均会受到一定的影响, 且预后效果不佳。所以在对肿瘤患者进行治疗时, 开展针对性的护理具有重要意义^[1]。据相关研究表明, 针对肿瘤患者, 护理人员开展优质护理服务, 不仅能够提高临床效果, 减少患者的预后时间, 而且还能够促进患者生活质量的提高。而护理人员的主要职责是在医生为患者提供治疗的过程中, 给予相应的协助。积极主动地与患者交流, 改善患者的心理状态, 使其能够配合临床各项工作, 促进预后效果提升。但在实际护理中, 一旦发生不良现象, 就会对护理质量直接影响, 甚至降低临床治疗的效率, 提高死亡率。所以, 为了提高护理质量, 需要对护理人员对相关知识的认知情况进行充分的了解, 采用科学的调查方法总结护理中的问题, 并针对性地制定解决对策, 能够促进护理人员的认知所提高, 为患者提供安全保障^[2]。为此, 本研究选取三家医院胸外科护理人员进行相关调查, 统计结果后做出如下报道。

1 资料与方法

1.1 一般资料

2021年7月起, 从本地区三家医院中选择120名胸外科护理人员进行研究分析, 于2022年7月完成研究。依据护理人员的工作单位将其分为A、B、C三个小组。每个小组中有40名护理人员。所有的护理人员资料均采用计算机录入, 并加以分析。护理人员均为女性, 最小年龄21岁, 最大年龄45岁,

(33.09 ± 12.28)为平均年龄。最短护龄的1年, 最长13年, (7.19 ± 1.36)年为平均护龄。所有的护理人员的学历分布情况为中专学历、大专学历和本科学历, 分别有30名、50名、40名。

1.2 方法

在调查的过程中, 明确相关主题, 并依据主题内容制定相关知识的调查问卷, 主要包括4个方面的内容, 分别是健康教育、心理护理、疼痛护理和死亡教育。通过调查了解护理人员是否充分的掌握健康宣教知识、是否掌握肿瘤患者护理期间的心理护理知识、是否掌握患者护理期间的疼痛护理知识、是否掌握患者接受护理期间的死亡教育相关知识。每一个项目均同时该类型的态度以及专业技能掌握两个部分进行分析。在所有护理问题认知态度调查中, 依据对肿瘤患者护理中该护理十分重要、一般重要和无所谓。十分重要说明护理人员护理态度正确, 若选择其他项目则态度错误。根据不同类型护理标准及操作流程对该护理技能掌握程度进行选题设置。若护理人员选择正确, 则得分, 若选择错误则不计分。本研究共发放127份调查问卷, 其中120份回收, 回收率为(94.49%)。

1.3 统计学处理

SPSS 23.0是本研究对计数资料和计量资料进行处理的主要系统, 分别采用 $n(\%)$ 、($\bar{x} \pm s$)对上述资料进行表示, 同时完成每个小组相关资料的统计, 组间所产生的计量资料使用t检验、计数资料使用 χ^2 进行检验, 如果存在差异说明有统计学意义, 则用($P<0.05$)表示。

2 结果

2.1 调查三组护理人员后的相关结果分析

三组护理人员调查结果显示, 各项目评分相比无明显差异不具有统计学意义($P>0.05$)。但三组关于死亡教育的调查结果中, 得分普遍低于其他三

项, 存在差异和统计学意义 ($P < 0.05$)。见表 1。

2.2 三组患者满意度比较

三组患者对护理满意度进行评价后发现, 无明显差异和统计学意义 ($P > 0.05$), 见表 2。

表 1 调查三组护理人员后的相关结果分析 (n/%)

组别	例数	健康教育		心理护理		疼痛护理		死亡教育	
		认知态度	操作技能	认知态度	操作技能	认知态度	操作技能	认知态度	操作技能
A 组	40	8.69±1.18	82.31±10.49	9.01±0.48	80.22±10.27	8.18±1.07	78.22±11.21	4.39±3.38	60.18±7.06
B 组	40	8.71±1.38	83.22±10.31	8.69±1.18	80.27±8.26	8.09±1.02	79.29±11.38	4.29±3.11	59.36±8.31
C 组	40	8.58±1.47	83.11±10.35	8.68±1.06	81.22±7.37	8.01±1.26	80.07±9.48	4.27±3.48	60.01±7.76

表 2 三组患者满意度比较 (n/%)

组别	例数	非常满意	基本满意	不满意	总满意度
研究组	30	13	16	1	29 (96.67%)
参照组	30	14	15	1	29 (96.67%)
P 值	30	12	16	2	28 (93.33%)

3 讨论

3.1 在对肿瘤患者护理过程中心胸外科护士的认知现状

(1) 健康宣教方面的认知

本研究调查结果显示, 在所有的调查中, 对于肿瘤患者护理期间, 护理人员掌握健康宣教的程度以及在护理中健康宣教对整体护理质量的影响及重要性, 是所有项目中掌握最好的一项, 由此可见, 在肿瘤患者护理的过程中, 对其进行相关知识的宣教, 以及患者对知识内容的需求, 护理人员有深刻的认识和体会, 同时护理人员充分的了解, 在护理过程中对患者进行全面的健康教育, 有利于良好关系的建立。

(2) 心理护理方面的认知

在本次调查结果分析中得知, 护理人员所在医院的不同, 其对肿瘤患者护理中开展心理护理相关内容的认知和重要性把握也存在一定的不同。这一结果指出, 医院在为护理人员进行相关业务培训和指导中, 其重点培训内容存在差异。

(3) 疼痛护理方面的认知

在肿瘤患者护理工作开展的过程中, 对护理质量的评价, 其中一项指标就是疼痛护理, 医院不同对疼痛护理的认知也有一定的区别。

(4) 死亡教育方面的认知

在护理认知调查中, 护理人员认知最差的一项就是死亡教育, 这可能与我国传统思想有一定的联系。

3.2 解决现状的相关对策

(1) 在对肿瘤患者进行护理的过程中, 应该对护理人员加强培训, 使其能够充分的了解患者的心理需求。许多护理人员在护理期间认识不到或未能全面认知患者的特性需求, 所以在护理期间容易对患者的心理方面形成忽视, 所以, 护理人员应该对患者的需求进行充分的了解, 从而采取相应的措施给予满足, 使患者保持良好的状态接受治疗^[3]。

(2) 对护理人员的专业水平及技能加强培训。在肿瘤患者护理工作中, 部分护理人员存在认识方面的不足, 认为死亡是肿瘤患者的最终结局, 固然会忽略在患者面前树立良好的护理形象。对于护理技能把握不足, 特别是疼痛方面的护理, 差异较大。因此护理部门应该制定相应的管理措施, 开展落实奖罚制度, 在护理培训中制定考核标准, 从而促进护理人员的积极性, 不断提高自身技能, 在实际护理中落实优质的护理服务^[4]。

(3) 护理人员之间加强专业交流, 尤其是各个医院之间的交流, 通过相互沟通, 学习不同医院的长处, 补充自身不足, 从而进一步提高护理认知和护理质量。

参考文献

- [1] 古永华, 娄玖玲, 王延歌. 原发性肝癌术后病人癌因性疲乏影响因素的调查分析及护理对策[J]. 全科护理, 2021, 19(14): 1952-1955.
- [2] 甘莎莎, 李玲美, 孙玉婷. 神经外科脑肿瘤患者护理中基于

心理干预的分析[J].心理月刊,2021,16(18):101-102+42.

- [3] 谈丽萍. 肿瘤癌痛护理障碍原因与护理策略研究[J]. 临床医药文献电子杂志,2018,5(56):124.
- [4] 杜丽丽. 手术室护士对老年患者护理风险和干预措施的认知调查[D].浙江大学,2017.

收稿日期: 2022年8月12日

出刊日期: 2022年10月11日

引用本文: 牟岚, 金志惠, 胸外科护士对肿瘤患者护理认知现状的调查及对策分析[J], 国际医学与数据杂志 2022, 6(5): 36-39.

DOI: 10.12208/j.ijmd.20220184

检索信息: RCCSE 权威核心学术期刊数据库、中国知网 (CNKI Scholar)、万方数据 (WANFANG DATA)、Google Scholar 等数据库收录期刊

版权声明: ©2022 作者与开放获取期刊研究中心 (OAJRC) 所有。本文章按照知识共享署名许可条款发表。
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>



OPEN ACCESS