

经尿道前列腺增生电切除术后护理中的相关注意事项及处理方法

宋元玉

云南省第二人民医院泌尿外科 云南 昆明

【摘要】 目的 对经尿道前列腺增生电切除术后护理中出现的的问题及处理方法进行研究。方法 本次实验共计抽取本院2019年2月-2020年2月期间接受尿道前列腺增生电切除术的患者76人,依据护理方法的不同将所选患者分为甲乙两组,两组均为43人。护理人员在实验过程中对甲组患者进行常规护理,在充分分析以往问题的基础上对乙组患者进行针对性护理,对两组患者护理满意情况、术后并发症出现情况及住院时长进行对比和分析。结果 研究结果显示,甲组患者与乙组患者在护理满意度方面表现出较大差异,乙组患者护理满意度较高,甲组患者护理满意度为81.40%,乙组患者护理满意度为97.67%,两组数据之间呈现统计学意义($p < 0.05$);甲组患者于乙组患者在术后并发症出现几率方面表现出较大差异,甲组患者术后并发症出现几率较高,甲组患者术后并发症出现几率为11.63%,乙组患者术后并发症出现几率为2.33%,两组数据之间呈现统计学意义($p < 0.05$);甲组患者与乙组患者在住院时长方面表现出较大差异,乙组患者住院时间较短,甲组患者住院时长为(12.9±3.5)天,乙组患者住院时长为(7.2±3.1)天,两组数据之间呈现统计学意义($p < 0.05$)。结论 对经尿道前列腺增生电切除术后护理中出现的的问题及处理方法进行研究,并在此基础上开展护理工作能够在一定程度上提高护理工作开展水平,促进患者护理满意度的提升,减少术后并发症的出现,缩短患者住院时长。

【关键词】 尿道前列腺增生电切除术; 术后护理; 护理满意度; 并发症; 住院时长

Related attention problems and treatment methods in nursing after transurethral resection of prostate hyperplasia

Yuanyu Song

Department of Urology, Second People's Hospital of Yunnan Province, Kunming, Yunnan

【Abstract】 Objective To investigate the problems and treatment methods in nursing after transurethral resection of prostate hyperplasia. **Methods:** A total of 76 patients who underwent electrosurgical resection of urethral prostatic hyperplasia in our hospital from February 2019 to February 2020 were selected in this experiment. The selected patients were divided into two groups according to different nursing methods, both were 43 people. Nursing staff conducted routine care for patients in group A during the experiment, targeted nursing for patients in group B based on a thorough analysis of past problems, and compared the satisfaction of nursing care, the occurrence of postoperative complications and the length of hospitalization of patients in the two groups and analysis. **Results:** The results of the study showed that patients in group A and group B showed significant differences in nursing satisfaction, patients in group B had higher nursing satisfaction, patients in group A had a nursing satisfaction of 81.40%, and patients in group B had a nursing satisfaction of 97.67%, statistically significant between the two groups of data ($p < 0.05$); Group A and Group B patients showed greater differences in the probability of postoperative complications, and Group A patients had a higher probability of postoperative complications. The incidence of postoperative complications in group A patients was 11.63%, and the incidence of postoperative complications in group B patients was 2.33%. The data between the two groups showed statistical significance ($p < 0.05$); There was a big difference in the length of hospitalization. Group B patients had shorter

hospital stays. Group A patients had a hospital stay of (12.9 ± 3.5) days. Group B patients had a hospital stay of (7.2 ± 3.1) days, which has academic significance ($p < 0.05$). **Conclusion:** To study the problems and treatment methods in nursing after transurethral resection of prostate hyperplasia and to carry out nursing work on this basis can improve the level of nursing work to a certain extent, promote the improvement of patient satisfaction and reduce the occurrence of postoperative complications shortens the length of hospitalization of patients.

【Keywords】 Electroresection of Urethral Prostatic Hyperplasia; Postoperative Care; Nursing Satisfaction; Complications; Length Of Hospital Stay

前列腺增生在临床上出现几率较高,对男性的健康有着较大的威胁,会对患者的正常生活及工作造成较大的负面影响,进而降低患者的生活质量。现阶段,临床上多是通过手术治疗的方式对前列腺增生患者进行治疗,但是值得注意的是,由于术后护理工作开展水平较低,手术治疗的效果得不到必要的保障,不利于患者的术后恢复。因此,对经尿道前列腺增生电切除术后护理中出现的问题及处理方法进行研究有着较强的现实意义。本次实验共计抽取本院2019年2月-2020年2月期间接受尿道前列腺增生电切除术的患者76人,护理人员在实验过程中对甲乙两组患者分别实施常规护理及针对性护理,现报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

本次实验共计抽取本院2019年2月-2020年2月期间接受尿道前列腺增生电切除术的患者76人,依据护理方法的不同将所选患者分为甲乙两组,两组均为43人。甲组所选43例患者中年龄最小为57岁,年龄最大为89岁,平均年龄为 (72.6 ± 5.9) 岁,患者患病时间最短为3年,患病时间最长为8年,乙组所选43例患者中年龄最小为59岁,年龄最大为87岁,均值为 (72.7 ± 6.1) 岁,患者患病时间最短为2年,患病时间最长为8年,两组患者年龄、患病时间等基本资料差异基本可以忽略不计,数据并没有表现出统计学意义($p > 0.05$)。纳入标准:本院伦理委员会同意本次实验的开展;所选患者及其亲属对本次实验的内容及可能导致的后果有着充分的了解;患者精神正常,意识清醒;患者及其亲属均签署自愿协议。排除标准:患者患有其他可能影响实验结果的疾病^[1]。

1.2 方法

护理人员在实验过程中对甲组患者进行常规护理,在充分分析以往问题的基础上对乙组患者进行

针对性护理。护理人员应通过常规护理手段对甲组患者进行护理,以减轻患者的痛苦,加快患者的康复。在乙组患者护理过程中,护理人员应对以往护理工作中出现血尿、膀胱痉挛及尿失禁等问题进行细致的分析,并研究导致相关问题的出现的具体原因,采取针对性的护理方案进行应对,以此提高护理工作的水平^[2]。护理人员在对乙组患者进行护理时应注意规避相关风险因素,在实际工作中与患者保持良好的沟通,注意询问患者的感受及需求,对患者进行知识宣讲和心理疏导,以此提高患者的顺应性,降低护理工作的难度。而且护理人员应注意对患者的饮食及活动进行规范,禁止患者使用辛辣油腻食物,保证患者饮食结构的合理性,确保患者能够得到足够的锻炼,以此促进患者的早日康复^[3]。

1.3 判断标准

对两组患者护理满意情况、术后并发症出现情况及住院时长进行对比和分析^[4]。

1.4 统计学处理

在SPSS22.0统计学软件下,计量资料及计数资料分别为 $(\bar{x} \pm s)$ 及 (n) ,检验分别通过 t 及 χ^2 , $P < 0.05$ 意味着数据呈现统计学意义^[5]。

2 结果

2.1 两组患者护理满意情况

研究结果显示,甲组患者与乙组患者在护理满意度方面表现出较大差异,乙组患者护理满意度较高,甲组患者护理满意度为81.40%,乙组患者护理满意度为97.67%,两组数据之间呈现统计学意义($p < 0.05$)。具体内容见表1。

2.2 两组患者术后并发症出现情况

研究结果显示,甲组患者于乙组患者在术后并发症出现几率方面表现出较大差异,甲组患者术后并发症出现几率较高,甲组患者术后并发症出现几率为11.63%,乙组患者术后并发症出现几率为2.33%,两组数据之间呈现统计学意义($p < 0.05$)。

表 1 两组患者护理满意情况

组别	人数 (n)	十分满意 (n)	比较满意 (n)	不满意 (n)	护理满意度 (%)
甲组	43	12	23	8	81.40
乙组	43	21	21	1	97.67
X ² 值	-	-	-	-	7.918
P 值	-	-	-	-	p<0.05

2.3 两组患者住院时长

研究结果显示,甲组患者与乙组患者在住院时长方面表现出较大差异,乙组患者住院时间较短,甲组患者住院时长为(12.9±3.5)天,乙组患者住院时长为(7.2±3.1)天,两组数据之间呈现统计学意义(p<0.05)。

3 讨论

现阶段,尿道前列腺增生电切除术在前列腺增生患者治疗中应用较为广泛,能够有效减轻前列腺增生患者的痛苦,促进患者的早日康复^[6]。但是由于护理工作开展过程中存在较多的问题,护理工作开展质量得不到必要的保障,对手术的效果造成了较大的负面影响,在一定程度上加大了患者家庭的经济负担,甚至有可能导致护患纠纷的出现。本次实验共计抽取本院2019年2月-2020年2月期间接受尿道前列腺增生电切除术的患者76人进行研究,意在经尿道前列腺增生电切除术后护理中出现的护理问题及处理方法进行研究^[7]。研究结果显示,甲组患者与乙组患者在护理满意度方面表现出较大差异,乙组患者护理满意度较高,甲组患者护理满意度为81.40%,乙组患者护理满意度为97.67%,两组数据之间呈现统计学意义(p<0.05);甲组患者于乙组患者在术后并发症出现几率方面表现出较大差异,甲组患者术后并发症出现几率较高,甲组患者术后并发症出现几率为11.63%,乙组患者术后并发症出现几率为2.33%,两组数据之间呈现统计学意义(p<0.05);甲组患者与乙组患者在住院时长方面表现出较大差异,乙组患者住院时间较短,甲组患者住院时长为(12.9±3.5)天,乙组患者住院时长为(7.2±3.1)天,两组数据之间呈现统计学意义(p<0.05)。

本次实验表明,对经尿道前列腺增生电切除术后护理中出现的护理问题及处理方法进行研究,并在此基础上开展护理工作能够在一定程度上提高护理工作开展水平。护理人员应采取针对性护理方法对经尿道前列腺增生电切除术后患者进行护理,以此减少护理问题的出现,促进患者的早日康复。

参考文献

- [1] 李建军,吴健平. 经尿道前列腺等离子电切除术治疗对前列腺增生合并糖尿病患者生活质量的影响研究[J]. 糖尿病新世界,2019,22(23):36-37.
- [2] 宋媛媛. 前列腺电切除术后患者的中医护理干预[J]. 西部中医药,2019,32(10):137-139.
- [3] 王红艳. 探讨经尿道前列腺汽化电切术治疗高龄良性前列腺增生症的护理方式研究[J]. 中国现代药物应用,2018,12(24):173-174.
- [4] 仇莹莹. 护理干预对经尿道前列腺电切除术患者术后并发症的影响核心研究[J]. 实用临床护理学电子杂志,2019,4(28):33.
- [5] 奚银华. 经尿道前列腺等离子电切术治疗前列腺增生症的围手术期护理[J]. 国际感染病学(电子版),2019,8(02):157-158.
- [6] 杨巍. 循证护理对前列腺增生电切术患者术后并发症及心理状况的影响[J]. 中国民康医学,2018,30(02):123-124.
- [7] 杨芹. 优质护理服务在经尿道前列腺电切除术治疗前列腺增生症中的应用效果[J]. 当代护士(下旬刊),2018,25(11):66-67.

收稿日期: 2020年5月1日

出刊日期: 2020年6月4日

引用本文: 宋元玉. 经尿道前列腺增生电切除术后护理中的相关注意事项及处理方法[J]. 国际护理学研究, 2020, 2(3): 292-294.

DOI: 10.12208/j.ijnr.20200087

检索信息: 中国知网、万方数据、Google Scholar

版权声明: ©2020 作者与开放获取期刊研究中心(OAJRC)所有。本文章按照知识共享署名许可条款发表。<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>



OPEN ACCESS